

## *Pseudocolopteryx dinellianus*

LR/nt (V/R<sup>10</sup>)

### DORADITO PARDO, DORADITO DE DINELLI, TAPYI

CR:

EN:

VU:

NT:  C2a

*Pseudocolopteryx dinellianus* es poco conocida, se la encuentra en bajos números en una área restringida en las zonas pantanosas de Argentina (probablemente existen registros tomados durante el invierno en zonas aleañas en Bolivia y Paraguay). Esta especie amerita ser investigada para así poder determinar sus necesidades y estatus de conservación.

**DISTRIBUCIÓN** *Pseudocolopteryx dinellianus* se encuentra al norte de Argentina (al noreste de Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán). Se la registró en dos ocasiones al sur de Bolivia (Tarija) y en otras tres ocasiones al suroeste de Paraguay (Presidente Hayes), estos datos probablemente corresponden a aves que se encontraban invernando (véase Ecología). A menos que existan otras, las coordenadas provienen de Nores *et al.* (1983).

■ **ARGENTINA** Se la registró en las siguientes provincias: (*Salta*) sin especificar (Olog 1979, Nores *et al.* 1983), esto podría asumirse basándose en un registro tomado en Tarija, Bolivia; (*Tucumán*) río Salí ("Río Sale"), 27°33'S 64°57'O, octubre de 1903 (dos especímenes en AMNH), estas localidades, evidentemente, parecen ser las fuentes de todos los registros obtenidos en esta provincia (incluyendo el espécimen tipo), desde que Dinelli (1933), indicó que esta especie había sido observada solamente a lo largo de este río "desde Tucumán a Santiago del Estero", los otros registros serían: "Tucumán", septiembre 1899 (dos especímenes en AMNH), enero de 1901 (especimen en AMNH), octubre de 1904 (especimen tipo colectado: Lillo 1905, Hellmayr 1906b, Esteban 1953b; también Laubmann 1934) y octubre de 1919 (especimen en USNM); (*Santiago del Estero*) parte oriental de la provincia (Olog 1979); Bañados de Figueroa, comúnmente (Nores *et al.* 1991); Bañados del río Dulce (30°15'S 62°30'O, extendiéndose dentro de Córdoba), octubre de 1971 (T. Narosky *in litt.* 1992) bajo la actual (Nores *et al.* 1991); (*Santa Fe*) San Carlos (sin registrar pero probablemente en San Carlos Norte, 31°41'S 61°05'O, San Carlos Centro, 31°44'S 61°06'O o San Carlos Sur, 31°45'S 61°06'O: véase Paynter 1985), donde dos aves fueron tomadas en abril de 1931 (Laubmann 1934); (*Córdoba*) Paso de la Cina (= Limache, 29°49'S 62°48'O), noviembre de 1980 (T. Narosky *in litt.* 1992); Bañados del río Dulce (extendiéndose desde Santiago del Estero), actualmente (Nores *et al.* 1983, 1991, Molli 1985); río Segundo, en la parte sur oriental de la Laguna Mar Chiquita (30°42'S 62°36'O: Paynter 1985), donde una pareja con un juvenil fueron observados en marzo de 1991 (D. Willis *in litt.* 1991, M. Pearman *in litt.* 1992), y se registraron cerca de seis machos cantando a mediados de octubre de 1991 (P.V. Hayman *in litt.* 1992, M. Pearman *in litt.* 1992); Estancia La Africa, al sureste de Mar Chiquita, octubre de 1991 (M. Pearman *in litt.* 1992); Laguna Ludeña (31°15'S 63°32'O), sin fecha (Nores *et al.* 1983); embalse del río Tercero (32°13'S 64°30'O), sin fecha (Nores e Yzurietta 1980; también Nores *et al.* 1983); río de los Sauces (32°32'S 64°35'O), sin fecha (Nores e Yzuriea 1980; también Nores *et al.* 1983).

■ **BOLIVIA** Esta especie es conocida a través de dos especímenes colectados en Villa Montes, Tarija, en abril y mayo de 1926 (Laubmann 1934).

■ **PARAGUAY** Existen únicamente tres registros, todos provienen del departamento de Presidente Hayes: Escalante (= Laguna Escalante, 23°50'S 60°46'O: Paynter 1989), donde un espécimen

fue colectado en agosto de 1960 (Steinbacher 1962); Carretera Trans Chaco km 79, donde se observó dos aves en mayo de 1990, y otra observación en la misma carretera (km 100) en junio de 1990 (P.A. Scharf per F. E. Hayes *in litt.* 1992).

**POBLACIÓN** Se conoce muy poco acerca de esta ave. En Argentina, Nores *et al.* (1983) reportaron que parecía ser “más o menos común, pero no abundante” en la provincia de Córdoba, mientras que Narosky e Yzurieta (1987) describieron que era “escasa o difícil de encontrar”. En Bañados de Figueroa y Bañados del río Dulce, Santiago del Estero, se consideró que era “frecuente” (v.g. casi todos los registros indican bajos números de esta especie) (Nores *et al.* 1991). Es conocida en Santa Fe a través de dos especímenes (véase Distribución), y a pesar de que fue considerada común cerca de San Carlos a principio de los años 30 (Laubmann 19340), M.R. de la Peña (*in litt.* 1991) nunca la registró, después de haber realizado un gran trabajo de campo en la provincia. D. Willis (*in litt.* 1991) consideró que esta especie era bien conocida por los ornitólogos en Mar Chiquita, Córdoba, y M. Pearman (*in litt.* 1992), dijo que era localmente común en la misma área. En Bolivia es conocida a través de dos especímenes colectados en otoño, y en Paraguay es considerada como una ave rara que migra en invierno a las tierras húmedas del Cacho (F.E. Hayes *in litt.* 1992), los tres registros obtenidos ahí, fueron tomados en los meses de otoño e invierno (véase Distribución).

**ECOLOGÍA** *Pseudocolopteryx dinellianus* habita en una vegetación periódicamente inundada, pantanosa y arbustiva, cerca de lechos de ríos (Olrog 1979, Canevari *et al.* 1991). Laubmann (1934) indicó que esta especie era común en las áreas de las lagunas de San Carlos, donde casi siempre se la encontró asociada con *Phleocryptes melanops*, anidando en el mismo hábitat (aunque esto podría ser irrelevante: M. Pearman *in litt.* 1992). Dinelli (1933), encontró que esta especie siempre estaba posada en los arbustos de *Baccharis lanceolata*. Los hábitos alimenticios de esta especie son poco conocidos, sólo se sabe que busca insectos dentro de la vegetación (Canevari *et al.* 1991). La reproducción ocurre durante la primavera austral y también durante el otoño. En Laguna Mar Chiquita, se observó a una pareja de adultos junto a un juvenil en marzo de 1991 (véase Distribución), y Laubmann (1934) hizo referencia a dos nidos que estaban siendo construidos en Santa Fe en abril de 1931. En Laguna Mar Chiquita, se registró una buena cantidad de machos mientras cantaban en una extensa área reproductiva en octubre de 1991 (P.V. Hayman *in litt.* 1992); en noviembre de 1931 se colectó una hembra, que contenía un huevo dentro del oviducto (probablemente en Tucumán), el nido de esta hembra se encontraba en la horquilleta de un arbusto a 1,2 m sobre el nivel del suelo (Dinelli 1933), y también se encontró otro nido, con dos huevos que recién habían eclosionado en noviembre de 1983 (Molli 1985) en Bañados del río Dulce.

Sin embargo, también se puede encontrar nidos en juncos y arbustos altos (Nores e Yzurieta 1980, Canevari *et al.* 1991; véase fotografías en Molli 1983). Esta ave parece ser un residente permanente en Argentina (Nores *et al.* 1983), sin embargo los registros tomados en Bolivia y Paraguay sugieren que realiza sus desplazamientos hacia el extremo norte durante los meses de invierno (Short 1975, Canevari *et al.* 1991); Dinelli (1933) notó que esta especie estaba presente en Tucumán desde octubre hasta enero (v.g. temporada reproductiva), pero no sabía si era un residente permanente o no.

**AMENAZAS** No se conoce ninguna, pero el territorio no muy extenso, los bajos números registrados y el conocimiento insuficiente de su hábitat debe ser un motivo de preocupación

**MEDIDAS TOMADAS** La Laguna Mar Chiquita esta protegida como una reserva WHSRN, la cual incluye una pequeña porción de Bañados del río Dulce (Scott y Carbonell 1986. La especie no se encuentra bajo una presión inmediata en este sector.

**MEDIDAS PROPUESTAS** Se deben realizar trabajos de campo que tengan como principal objetivo el delimitar los territorios de reproducción de esta especie, conocer el número de sub-poblaciones existentes y el número estimado de aves que contiene. También es importante el dar mas información general acerca de los requerimientos de su hábitat, alimentación, anidación, movimientos estacionales, etc., con el propósito de determinar la áreas que podrían encontrarse bajo alguna amenaza.