

■ BOLIVIA



La Paraba Azul o Guacamayo Jacinto (*Anodorhynchus hyacinthinus*, EN) está amenazada debido al tráfico como mascota y se encuentra en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías (BO002) y en el Parque Nacional Kempf Mercado (BO020), en el departamento de Santa Cruz. (FOTOGRAFÍA: WERNER DENSER/ASOCIACIÓN ARMONIA)

El Programa de Conservación del 'Mamaco' (*Crax globulosa*, VU) incluye una campaña de educación ambiental con las comunidades locales, como parte de la recuperación de la especie, como es el caso de la comunidad de San Marcos en la IBA Bajo Río Beni, Región Tacana (BO003). (FOTOGRAFÍA: BENNETT HENNESSEY/ASOCIACIÓN ARMONIA)






La Paraba Barba Azul (*Ara glaucogularis*), especie en Peligro Crítico y endémica de Bolivia, se encuentra amenazada debido a la destrucción de su hábitat y al tráfico de especies. En la foto, se observa un incendio provocado para la sustitución de pastos en las Pampas del Beni, hábitat de esta ave. (FOTOGRAFÍAS: ASOCIACIÓN ARMONÍA)

Armonía está llevando a cabo actividades de educación ambiental a favor de la Paraba Frente Roja (*Ara rubrogenys*, EN) en diversas comunidades bolivianas, entre ellas la comunidad de Perereta, en la IBA Cuencas de Ríos Caine y Mizque (BO008). (FOTOGRAFÍAS: FELIX HUAQUIPA/ASOCIACIÓN ARMONÍA, MARK BOUSEKE/ASOCIACIÓN ARMONÍA -INSERTO-)



La IBA Yungas Inferiores del Parque Nacional Carrasco (BO012) fue uno de los sitios más importantes para *Pauxi unicornis* (VU) en el pasado. Lamentablemente, el último censo realizado en octubre de 2004 muestra su ausencia debido a la destrucción de hábitat. (FOTOGRAFÍA: RODRIGO SORIA/ASOCIACIÓN ARMONIA)



La Reserva Privada Los Volcanes se encuentra adyacente al Parque Nacional Amorbó, que comprende las IBAs BO013 y BO032. En esta área se realizan estudios de aves tanto residentes como migratorias, habiéndose anillado hasta el momento 80 especies, incluyendo seis individuos de Tíctico Boliviano (*Simoxenops striatus*, VU), especie endémica de Bolivia. (FOTOGRAFÍA: RODRIGO SORIA/ASOCIACIÓN ARMONIA)

■ COLOMBIA



- El Saltarín Dorado (*Chloropipo flavicapilla*, NT), especie que se encuentra en Colombia, Ecuador y Perú, es un ave poco común que habita entre los 1200 - 2400 m, presente en la IBA Reserva Forestal Yotoco (CO028). (FOTOGRAFÍA: BANCO DE IMÁGENES AMBIENTALES INSTITUTO HUMBOLDT)

- El Tucán Barbudo (*Semnornis ramphastinus*, NT), especie presente en la IBA Reserva Natural La Planada, Nariño (CO069). (FOTOGRAFÍA: BANCO DE IMÁGENES AMBIENTALES INSTITUTO HUMBOLDT)



- El Colibrí Rubí (*Chrysolampis mosquitus*, NT) es una especie muy colorida que se encuentra presente en la IBA Serranía de las Quinchas (CO076), localizada en el valle medio del río Magdalena. (FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN PROAVES)



El Festival del Paujil intenta sensibilizar a la comunidad colombiana en cuanto la preservación del Paujil de Pico Azul (*Crax alberti*, CR), especie endémica de Colombia. (FOTOGRAFÍAS: FUNDACION PROAVES)



El Loro Coroniazul (*Hapalopsittaca fuertesii*, EN), especie que fue redescubierta en 2002. Se conoce, al momento, una población de menos de 83 individuos en la Reserva Natural El Mirador, que está dentro de la IBA Páramos y Bosques Altoandinos de Génova (CO057), en la región de Risaralda y Tolima. (FOTOGRAFÍA: FUNDACION PROAVES)



La participación de la comunidad infantil fue pieza clave de la ceremonia de designación de la IBA Lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio (CO077). (FOTOGRAFÍA: GUSTAVO BRAVO/INSTITUTO VON HUMBOLDT)



Como parte de las actividades de concienciación a favor de las aves y la conservación de la biodiversidad, el Grupo Ecológico Quinchas de Colombia, celebra el Festival Mundial de las Aves, durante el cual se realizan desfiles alegóricos, concursos de dibujo y charlas de educación ambiental. (FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN PROAVES)



El Loro Orejiamarillo (*Ognorhynchus icterotis*, CR) se encuentra amenazado debido al saqueo de nidos y tráfico ilegal, y a que su área de anidación, los bosques de Palmas de Cera (*Ceroxylon quindiuense*), ha disminuido drásticamente en la última década. Actualmente, la Fundación ProAves trabaja en la IBA Bosques Montanos del Sur de Antioquía (CO024) para conservar esta especie. (FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN PROAVES)

■ ECUADOR



El archipiélago de Galápagos es conocido por su avifauna única, un 50% de la cual es endémica; entre ellas, el Gavilán de Galápagos (*Buteo galapagoensis*, VU) y el Pinguino de Galápagos (*Spheniscus mendiculus*, EN). Once especies se encuentran amenazadas, entre ellas, el Petrel Pata Pegada (*Pterodroma phaeopygia*, CR). También es un sitio importante para el paso de especies migratorias, como es el caso del Playero Patiamarillo Mayor (*Tringa melanoleuca*). (FOTOGRAFÍAS: PRINCIPAL, MURRAY COOPER, INSERTOS DE ARRIBA HACIA ABAJO, DAVID WIEDENFELD, D. WIEDENFELD, FRANCISCO CRUZ-DELGADO Y MURRAY COOPER)

- Mindo y Estribaciones Occidentales del Volcán Pichincha, que fue nominado como la primera IBA de Sudamérica, mantiene poblaciones de aves únicas y espectaculares como el Gallo de la Peña (*Rupicola peruviana*) y el Pájaro Toro (*Cephalopterus penduliger*, VU), cuya población ha declinado rápidamente debido a la pérdida de hábitat y la cacería. (FOTOGRAFÍAS: KEREM BOYLA Y MURRAY COOPER -INSERTOS-)





Los bosques de tierras bajas de la Amazonía albergan no solo una elevada biodiversidad, que incluye a especies tan particulares como el Hoacín o Shunsho (*Opisthocomus hoazin*), si no también importantes nacionalidades indígenas, como los Achuar, que contribuyen a la protección de estos bosques. (FOTOGRAFÍAS: MURRAY COOPER)



El Mochuelo de Bosque Nublado (*Glaucidium nubicola*, VU), especie poco común y presente en Colombia y Ecuador, fue descrita recientemente y se encuentra amenazada por la reducción de su hábitat debido principalmente a la extracción de madera. (FOTOGRAFÍA: MURRAY COOPER)


■ PERÚ

- La costa de Perú mantiene poblaciones de aves amenazadas como el Pinguino de Humboldt (*Spheniscus humboldti*, VU), especie que en este país cuenta con una población de 4.500 individuos, distribuida en cinco colonias. (FOTOGRAFÍAS: CARLOS MENDOZA)



- La Remolinera Real (*Cinclodes aricomae*, CR), se encuentra confinada a los parches de bosques de *Polylepis* de la cordillera de los Andes al sudeste de Perú, en las IBAs Runtacocha - Morocochay (PE092) y Mandorcasa (PE094). Su hábitat está amenazado por las quemadas repetitivas y el pastoreo de ganado. (FOTOGRAFÍA: CONSTANTINO AUCCA)






Los bosques de la región Tumbesina representan uno de los sitios más ricos en biodiversidad y amenazados del mundo, con un elevado número de especies de rango restringido como la Pava Aliblanca (*Penelope albipennis*, CR) y el Perico Cachetigris (*Brotogeris pyrrhopterus*, EN). (FOTOGRAFÍAS: DE ARRIBA HACIA ABAJO, HEINZ PLENKE, JEREMY FLANAGAN Y DAVID THOMAS)

- El Colibrí Maravilloso (*Loddigesia mirabilis*, EN), endémico de Perú, se encuentra amenazado por la extensa deforestación. Habita en la IBA Florida y Laguna Pomacochas (PE054), en las estribaciones occidentales del valle del río Utcubamba (inserto) y en la localidad de San Martín. (FOTOGRAFÍAS: HEINZ PLENGE Y JEREMY FLANAGAN -INSERTO-)



■ VENEZUELA



■
En el Parque Nacional Canaima (VE061) se encuentran formaciones geológicas impresionantes llamadas tepuyes, como el Kukenan (ver inserto) y la caída de agua más alta del mundo, el Salto del Ángel (979 m). En esta IBA se encuentran especies como *Morphnus guianensis* (NT), *Harpia harpyja* (NT) y *Amazona dufresniana* (NT). (FOTOGRAFÍAS: HAROLDO CASTRO/ CONSERVATION INTERNATIONAL)

- El Parque Nacional Jaua-Sarisariñama es una IBA (VE064) por la presencia de 22 de las 38 especies endémicas de la EBA 064, y se encuentra dentro de la cuenca del Río Caura (inserto). El Río Ventuari es lindero del Parque Nacional Yapacana. (FOTOGRAFÍAS: HAROLDO CASTRO/CONSERVATION INTERNATIONAL)



- El Parque Nacional Sierra Nevada (VE041) se encuentra la cordillera de Mérida, que incluye los picos más altos del país, como el Humboldt (4.942 m) y el Bolívar (5.007 m). En esta IBA se han registrado 230 especies de aves incluyendo *Crax pauxi* (VU), *Grallaria excelsa* (VU) y *Hemipingus goeringi* (VU). (FOTOGRAFÍAS: FUNDACIÓN PROGRAMA ANDES TROPICALES, LORENZO CALCAÑO/ SCAV -INSERTO-)

- El Parque Nacional Perijá (VE018) es una de las áreas de mayor interés ornitológico en Venezuela, por la alta diversidad y endemismo que presenta. En la foto, un grupo de investigadores de SCAV haciendo observaciones de aves en este bosque nublado. (FOTOGRAFÍA: LORENZO CALCAÑO/SCAV)



- La Granicera Hermosa (*Pipreola formosa*) es una especie endémica de Venezuela que habita en los bosques premontanos y montanos húmedos. (FOTOGRAFÍA: LORENZO CALCAÑO/SCAV)



- Las lagunas costeras enfrentan una serie de problemas ambientales, entre ellos la contaminación urbana e industrial y la cacería indiscriminada de especies acuáticas como es el caso de este flamenco (*Phoenicopterus ruber*) atrapado en la Laguna de Píritu, Estado Anzoátegui. (FOTOGRAFÍA: LORENZO CALCAÑO/SCAV)