

Formicivora erythronotos

EN (E¹)

TILUCHÍ CAPUCHANEGRA, FORMIGUEIRO-DE CABEÇA NEGRA

CR: □

EN: ■ B1+2a,b,c,e

VU: ■ A1c; A2c; C1; C2a; D2

NT: □

El redescubrimiento de esta pequeña ave de sotobosque en 1987, después de un siglo o más, ha permitido conocer que esta especie habita en el bosque secundario a nivel del mar en una área en el sur de la costa del estado de Río de Janeiro, Brasil.

DISTRIBUCIÓN *Formicivora erythronotos* (véase Comentarios 1) es endémica del sureste de Brasil en el estado de Río de Janeiro. Su presencia en Espírito Santo (Ruschi 1953), aunque ha sido admitida por Pinto (1978) y Meyer de Schauensee (1982), no ha encontrado fundamentos y no ha sido aceptada en este texto. La especie fue registrada a mediados del siglo diecinueve, en Nova Friburgo (Burmeister 1856), donde se pensó estaba confinada (véase Comentarios 2) hasta que fue redescubierta en septiembre de 1987 al nivel del mar cerca de Angra dos Reis, en el sur de la costa del estado de Río (Pacheco 1988a). Estudios posteriores han logrado localizar a esta especie en diferentes puntos en los alrededores de Cunhambebe ("Frade") en el lado occidental de Baía da Ribeira (F. Carvalho per J.F. Pacheco *in litt.* 1991).

POBLACIÓN El ave era conocida únicamente a través de las 20 pieles obtenidas en el siglo diecinueve que se encontraban en museos Europeos y Americanos (Pacheco 1988a), no fue registrada por más de un siglo, y ha permanecido por mucho tiempo en las listas de aves amenazadas (Vincent 1966-1971, Sick 1969, 1972, King 1978-1979, Sick y Teixeira 1979, Sick 1985) y casi extintas (King 1978-1979, Scott y Brooke 1985). Después de su redescubrimiento no se han realizado estudios posteriores, pero la especie es obviamente muy local y sus números en los alrededores de Baía da Ribeira son bajos, tal como predijo King (1978-1979).

ECOLOGÍA Burmeister (1856) reportó que esta ave vivía en grupos pequeños en el sotobosque de Nova Friburgo, lo cual parecía inusual en vista de lo que ya se conoce de otras especies del género *Formicivora*. El sitio donde fue redescubierta fue descrito como un parche húmedo de bosque secundario cerca de la línea de manglar, pero su presencia fue más tarde verificada en el bosque secundario seco, también cerca del sitio del redescubrimiento y al nivel del mar (Pacheco 1988a). Aparentemente en esta zona las aves viven en parejas y una de ellas fue observada alimentándose en el follaje principalmente hasta 1 m de altura desde la superficie del suelo, y algunas veces hasta 2 m, junto con otros individuos; otras especies de aves que fueron registradas en el mismo sitio fueron *Amaurolimnas concolor*, *Automolus leucophthalmus*, *Manacus manacus*, y las casi amenazadas *Myrmotherula minor* y *M. unicolor* (Pacheco 1988a). No existe más información, ya sea sobre el tipo de alimentación o reproducción de esta especie.

AMENAZAS Toda la región alrededor de Angra dos Reis y Baía da Ilha Grande es una de las zonas turísticas más exclusivas de la costa de Río de Janeiro y ha estado sujeta a un verdadero desarrollo extensivo durante los últimos 20 años. Y aunque la distribución de esta especie se acerca a los límites del Parque Nacional Serra da Bocaina, al Área de Protección Ambiental Cairuçu, a la Estación Ecológica Tamoios y al Área de Protección Ambiental Tamoios, no ha sido registrada

hasta ahora en ninguna de esas áreas.

MEDIDAS TOMADAS La especie se encuentra protegida bajo las leyes brasileñas (Bernardes *et al.* 1990). Su redescubrimiento ha parado cualquier intención de colección de especímenes (Pacheco 1988a).

MEDIDAS PROPUESTAS Es necesario realizar estudios de esta especie en el campo para evaluar su estatus de conservación de forma precisa, y esto debe realizarse en conjunción con las acciones para proteger por lo menos parte de su hábitat. No se deben realizar más colecciones de especímenes de esta especie.

COMENTARIOS (1) *Formicivora erythronotos*, fue descrita originalmente dentro del género *Formicivora*, pero años después fue transferida a *Myrmotherula*, donde ha sido mantenida durante todo el siglo veinte por diferentes autoridades en la materia (v.g., von Ihering y von Ihering 1907, Cory y Hellmayr 1924, Pinto 1938, 1978, Meyer de Schauensee 1982, Sick 1985). Sin embargo, después de su redescubrimiento y de lo que se ha podido aprender de su comportamiento, apariencia de los individuos y las vocalizaciones, parecería que realmente pertenece a *Formicivora* (Pacheco 1988a, B.M. Whitney *in litt.* 1990, LPG). (2) Nova Friburgo ha sido citada como la única localidad en la que se ha registrado a esta ave con seguridad a lo largo del siglo veinte y en toda la literatura ornitológica, pero las anotaciones de Burmeister (1856) podrían ser poco confiables, y la especie pudo nunca haber sido colectada allí (Pacheco 1988a).