

## *Penelope ochrogaster*

EN (V/R<sup>10</sup>)

### PAVA-YACU VENTRIOCRE, PAVA VENTRIRUFA, JACU-DE-BARRIGA-CASTANHA

CR:

EN:  B1+2a,b,c,d,e

VU:  C1; C2a

NT:

*Esta pava, que parece ser muy raro, ocupa una área amplia pero mal definida del centro de Brasil, donde habita en parches y galerías de bosque semi-decidual en áreas más secas. Podría contar con una población baja y ha sido registrado en una sola área protegida.*

**DISTRIBUCIÓN** Se conoce la presencia de *Penelope ochrogaster* en algunas localidades dispersas en el centro de Brasil, desde Goiás hasta el oeste de Minas Gerais y el sur de Mato Grosso. Es posible que se halle también presente en la vecina Bolivia, donde el hábitat apropiado es extenso (C. Yamashita *in litt.* 1987). En el detalle que aparece a continuación las localidades se encuentran ordenadas de norte a sur, de acuerdo con coordenadas tomadas de Paynter y Traylor (1991).

**Tocantins** Existe un registro de Macaúba, Ilha do Bananal, mayo de 1962 (especimen en MNRJ), proveniente de dentro de los confines del Parque Nacional Araguaia, de acuerdo con TAW (1986); y existen registros de observaciones de un número pequeño que se hallaba presente en el parque a fines de los años 70 y principios de los 80 (R.S. Ridgely verbalmente 1986).

**Goiás** Existen dos localidades: en la parte media del río Paranã, cerca de Monte Alegre de Goiás (desembocadura del río São Domingos), 1932/1933 (Pinto 1938, 1964; dos especímenes en MCZ), y Leopoldina (ahora Aruanã), río Araguaia, julio 1906 (Hellmayr 1908).

**Mato Grosso** Los registros provienen de São Domingos, a 13°30'S 51°23'O, septiembre de 1949 (Pinto y de Camargo 1952); Pindaíba, agosto de 1949 (Pinto y de Camargo 1952); "Engenho do Pari" cerca de Cuiabá, junio de 1825 (von Pelzeln 1868-1871); Flechas, a 16°02'S 57°15'O, julio de 1825 (von Pelzeln 1868-1871); cerca de Cáceres, 1909 (especimen en MNRJ); Poconé, en la frontera norte del Pantanal, en la actualidad (C. Yamashita *in litt.* 1987, A. Whittaker *in litt.* 1991); cerca de Descalvados, 1825 y 1916 (von Pelzeln 1868-1871, Naumburg 1930); alrededor (pero no dentro) del Parque Nacional Pantanal, en la confluencia de los ríos Paraguai y Cuiabá, en cuatro localidades, a saber Fazenda Sara (a 17°42'S 57°04'O), Fazenda Belice (a 17°46'S 57°14'O), Rita Velha (a 17°49'S 57°14'O) y Morro Campo (a 17°54'S 57°22'O), a principios de 1992 (R.B. Pineschi *in litt.* 1992, de donde provienen las coordenadas); y en Porto Jofre, cruzando el río desde Mato Grosso do Sul, agosto de 1991 (TAP).

**Mato Grosso do Sul** Existe un solo registro proveniente del extremo norte del estado, a lo largo del río Piquiri, 1909 (especimen en MNRJ); pero el registro de Porto Jofre mencionado anteriormente sugiere que debe estar presente en áreas vecinas, al sur del río Cuiabá.

**Minas Gerais** Una serie colectada en Pirapora, ribera derecha del río São Francisco, en 1912 y 1913 (Pinto 1938, 1952), representa el único registro conocido de la especie en Minas Gerais, el reporte sobre su reciente presencia en esta área es erróneo (de Mattos *et al.* 1984) (G.T. de Mattos verbalmente 1987).

**POBLACIÓN** No se conoce su número. *Penelope ochrogaster* ha sido considerada como "una especie rara, por lo menos en las colecciones" (Delacour y Amadon 1973) y "ciertamente rara" (C. Yamashita *in litt.* 1986), aunque otro punto de vista expresa que "no es común, pero no se encuentra particularmente amenazada" (J. Vielliard *in litt.* 1986). La extraordinaria escasez de registros,

tanto de especímenes como de observaciones, sugiere al menos que el ave se encuentra localizada en sitios muy elevados o es en extremo sigilosa. La fuente más común de registros es Poconé, y en este sitio parece hallarse presente por lo menos en forma moderadamente común y disfrutar de una relativamente baja presión en cuanto a las actividades de caza (A. Whittaker *in litt.* 1991).

**ECOLOGÍA** No se ha reportado virtualmente nada sobre los hábitos de esta pava; se dice que es probable que se encuentre presente en las áreas más provistas de madera, a lo largo de los ríos, o en los pantanos (Delacour y Amadon 1973) y que habita en bosques intercalados con campo (Sick 1985). En las dos ocasiones en las que J. Natterer encontró a la especie, ésta se hallaba junto a un arroyo y, en uno de los casos, las aves (una pareja) se hallaban posadas en árboles (von Pelzeln 1868-1871). Su hábitat preferido en Poconé ha sido descrito como uno de “cordilheiras” de bosque semi-decíduo de galería (C. Yamashita *in litt.* 1987) que crecen en terrenos elevados y rara vez se inundan (Alho y Rondon 1987), con, v.g., guatambu *Aspidosperma* sp., goncaleiro *Astرونium urundeuva*, louro *Ocotea* sp., laranjeira *Sebastiania* sp., tarumarana *Vitex* sp. y paratudo *Tabebuia* sp.; en la estación seca, de julio a octubre, las tierras que se hallan bajo esta vegetación están llenas de hojas muertas (C. Yamashita *in litt.* 1987). Este constituía también el hábitat de aves que fueron encontradas en la misma área a principios de 1992 (R.B. Pineschi *in litt.* 1992). Dos aves se encontraban, en Porto Jofre, en bosque estacional de pantano con numerosos higos *Ficus* en fruto, y otra a 15-20 m, en árboles altos, principalmente de *Vochysia divergens*, *Inga* sp., *Triplaris* sp. y *Pithecellobium multiflorum* (TAP).

Se ha observado a la especie alimentándose de las flores de un árbol *Tabebuia* en compañía de *Crax fasciolata*, *Pipile cumanensis* y *Ortalis canicollis*; en Poconé, el ave también es simpátrica con *Penelope superciliaris*, y es la más rara de los crácidos en el bosque semi-decíduo del Pantanal (C. Yamashita *in litt.* 1986,1987). No existe información respecto de su reproducción; tres aves colectadas en junio y julio no mudaban su plumaje (von Pelzeln 1868-1871).

**AMENAZAS** No se conoce ninguna amenaza pero se presume que se caza a la especie en busca de alimento como ocurre con la mayoría de los crácidos grandes en América del Sur. Es difícil pronunciarse sobre lo extenso de la pérdida de su hábitat o respecto de si tiene o no lugar tal pérdida, dado lo poco que se conoce con certeza sobre las preferencias de la especie, en general, pero cabe anotarse la presencia de un gran desarrollo agrícola dentro de su área de distribución (véase, v.g., Amenazas bajo *Columbina cyanopsis* y *Anodorhynchus hyacinthinus*).

**MEDIDAS TOMADAS** La ley protege a la especie en Brasil (Bernardes *et al.* 1990). Se la ha registrado por lo menos alrededor de la periferia del Parque Nacional Pantanal (R. B. Pineschi *in litt.* 1992); no obstante, el registro de una observación realizada dentro del presente Parque Nacional Araguaia es la única evidencia cierta de su presencia dentro de una área protegida.

**MEDIDAS PROPUESTAS** Se requieren estudios para delimitar el rango de distribución actual de *Penelope ochrogaster* y para evaluar su estatus con mayor precisión. Los Parques Nacionales Pantanal y Araguaia merecen particular atención. Debe llevarse a cabo trabajos en Poconé, el único sitio en donde la especie puede ser encontrada con relativa facilidad (C. Yamashita *in litt.* 1987), a fin de determinar su ecología en el sitio, con miras a aplicar las observaciones resultantes en una evaluación general en cuanto a su probable distribución y situación.

**COMENTARIOS** *Penelope ochrogaster* forma una superespecie con dos crácidos semi-amenazados, *Penelope jacucaca* y *P. pileata* (v.g., Vaurie 1968, Delacour y Amadon 1973, Sick 1985). Es conocida localmente en Poconé como “jacucaca” (C. Yamashita *in litt.* 1987).