

## *Synallaxis kollari*

EN (V<sup>9</sup>)

### PIJUÍ DE RORAIMA, JOÃO-DE-BARBA-GRISALHA

CR:

EN:  B1+2c,e; C2b

VU:  D1; D2

NT:

*Este raro furnarido es conocido solo a través de seis especímenes y de una observación realizada a lo largo de cuatro ríos diferentes en el norte de Roraima, Brasil. Casi nada se conocía sobre su ecología, hasta que se observó dos aves en agosto de 1992, el último registro conocido era el del año 1956.*

**DISTRIBUCIÓN** *Synallaxis kollari* es conocida solo al norte de Roraima en el extremo norte de Brasil. Existen únicamente cuatro registros de esta especie, los cuales son (coordenadas de Paynter y Traylor 1991): río Cotingo (un afluente del lado izquierdo del río Surumu), localidad mencionada por Vaurie (1980), de donde aparentemente proviene un espécimen; río Surumu (tributario del lado derecho del río Tacutu), de donde proviene un espécimen colectado en julio de 1956 (Pinto 1966); Conceição do Maú, en los bancos del río Tacutu (a 2 km de la frontera con Guayana), en donde un par de aves fueron observadas en agosto de 1992 (B.C. Forrester *in litt.* 1992); y Fortaleza de São Joaquim (3°01'N 60°28'O: aprox. 28 km al norte de Boa Vista en la parte superior del río Branco), donde se colectó los especímenes tipo de cuatro aves en 1831-1832 (von Pelzeln 1868-1871, Sclater 1874, Cory y Hellmayr 1925).

**POBLACIÓN** Aparentemente esta especie es conocida solo a través de seis especímenes colectados durante o antes de 1956, lo que sugiere que es poco probable que sea una ave común donde sea que exista. No fue registrada en 1988, cuando *Cercomacra carbonaria* fue estimada como relativamente común en esta área (la parte superior del río Branco); históricamente, fue registrada en menor número que *carbonaria* (ver detalles relevantes). Solo dos aves (aparentemente una pareja) fueron vistas (después de algunos días de búsqueda) en el río Tacutu en agosto de 1992 (B.C. Forrester *in litt.* 1992), sin embargo esta información es muy limitada para poder estimar la densidad de la población.

**ECOLOGÍA** No existen anotaciones importantes en los registros anteriores a agosto de 1992, cuando una pareja de aves fue localizada en el bosque ribereño estacionalmente inundado con sotobosque denso y abundantes enredaderas (B.C. Forrester *in litt.* 1992).

**AMENAZAS** En la actualidad, los bosques a lo largo de los ríos dentro del rango de distribución de *kollari* se hallan prácticamente prístinos y no parecen estar bajo mayor presión (D. F. Stotz *in litt.* 1988); sin embargo, con tan poco conocimiento sobre su distribución restringida o sobre sus requerimientos ecológicos, las amenazas potenciales existen y deben ser consideradas antes de ser reconocidas.

**MEDIDAS TOMADAS** No se conoce ninguna.

**MEDIDAS PROPUESTAS** La prioridad de investigación en esta especie debe estar enfocada a descubrir la extensión de su distribución actual, determinar sus requerimientos ecológicos e implementar medidas de protección reales, las cuales deben ser tomadas en conjunción con aquellas delineadas para *Cercomacra carbonaria*.